



1. Сполука, яка являє собою (R)-N-(2-(4-ціанотіазолідин-3-іл)-2-оксоетил)-6-морфолінохінолін-4-карбоксамід, що характеризується структурою:




або її фармацевтично прийнятна сіль.

2. Сполука за п. 1, яка являє собою несольову форму (R)-N-(2-(4-ціанотіазолідин-3-іл)-2-оксоетил)-6-морфолінохінолін-4-карбоксаміду, що характеризується структурою:



3. Сполука за п. 1, яка являє собою фармацевтично прийнятну сіль (R)-N-(2-(4-ціанотіазолідин-3-іл)-2-оксоетил)-6-морфолінохінолін-4-карбоксаміду, що характеризується структурою:



4. Фармацевтична композиція, що містить сполуку за будь-яким із пп. 1-3 і одну або більше фармацевтично прийнятних допоміжних речовин.

5. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 для застосування у лікуванні FAP-опосередкованого стану в суб'єкта, який страждає від FAP-опосередкованого стану.

6. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 для застосування у попередженні FAP-опосередкованого стану в суб'єкта, який є сприйнятливим до FAP-опосередкованого стану.
7. Сполука для застосування за п. 5 або 6, де FAP-опосередкований стан вибраний із групи, що складається із захворювання печінки, цукрового діабету 2 типу, серцево-судинних станів, ожиріння, станів, пов'язаних з ожирінням, фіброзу, келоїдного порушення, запалення і захворювання на рак.
8. Сполука для застосування за п. 7, де FAP-опосередкований стан являє собою захворювання печінки.
9. Сполука для застосування за п. 8, де захворювання печінки являє собою неалкогольну жирову хворобу печінки (NAFLD), причому NAFLD вибрана з ізольованого стеатозу, неалкогольного стеатогепатиту (NASH), фіброзу печінки й цирозу.
10. Сполука для застосування за п. 8, де захворювання печінки являє собою неалкогольний стеатогепатит.