

1. Спосіб протруювання насіння, який полягає у тому, що насіння обробляють інсекто-фунгіцидною композицією, що містить принаймні один фунгіцид, принаймні один інсектицид та допоміжні агенти, який **відрізняється** тим, що використовують композицію, яка як фунгіциди містить протіоконазол, флудіоксоніл та флуопірам, а як інсектицид містить тіаметоксам.

2. Спосіб протруювання насіння за п. 1, який **відрізняється** тим, що композиція містить протіоконазол, флудіоксоніл, флуопірам, тіаметоксам та допоміжні агенти, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

протіоконазол	1,0-5,0
флудіоксоніл	1,0-5,0
флуопірам	0,5-2,0
тіаметоксам	10,0-20,0
допоміжні агенти	решта.

3. Спосіб протруювання насіння за п. 2, який **відрізняється** тим, що використовують композицію, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

протіоконазол	2,0-3,0
флудіоксоніл	2,0-3,0
флуопірам	0,5-1,0
тіаметоксам	12,0-17,0
допоміжні агенти	решта.

4. Спосіб протруювання насіння за п. 3, який **відрізняється** тим, що використовують композицію, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

протіоконазол	2,36
флудіоксоніл	2,36
флуопірам	0,71
тіаметоксам	14,19
допоміжні агенти	решта.

5. Спосіб протруювання насіння за п. 1, який **відрізняється** тим, що композиція містить протіоконазол, флуопірам, флудіоксоніл та тіаметоксам у співвідношенні 3,0-4,0:3,0-4,0:0,5-1,5:15,0-25,0.

6. Спосіб протруювання насіння за п. 5, який **відрізняється** тим, що композиція містить протіоконазол, флуопірам, флудіоксоніл та тіаметоксам у співвідношенні 3,3:3,3:1,0:20,0.