

Спосіб виробництва сухої розчинної суміші на основі білка соняшникового для ентерального харчування, що включає чотири основні етапи та внесення компонентів у розрахунку на 100 кг виробу, згідно з яким: на першому етапі проводять просіювання сировини крізь сито, на другому етапі здійснюється тритурація, що передбачає внесення рибофлавіну, піридоксину, бета-каротину і 100 г білка з порошку з насіння соняшнику, їх перемішування упродовж 10-15 хв, на третьому етапі проводять попереднє змішування, при якому завантажуються 48,0 кг білка з порошку з насіння соняшнику, коензим Q10, глюконат цинку та суміш, що отримана в результаті попередньої тритурації, і змішують упродовж 15-20 хв, на четвертому етапі у змішувач із сумішшю, отриманою після попереднього змішування, додають решту передбаченої кількості білка з порошку з насіння соняшнику, цукор кристалічний, середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер, фруктозу, лецитин соняшниковий, L-глутамін, L-лізин, аскорбінову кислоту, екстракт кореня цикорію, рутин, кальцію лактат, магнію цитрат, глюкозаміну гідрохлорид і перемішують протягом 15-20 хв, при цьому рецептурні компоненти для приготування суміші беруть у наступних співвідношеннях, мас. %:

білок з порошку з насіння соняшнику	40,000-41,000
цукор кристалічний	37,500-38,500
середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер	10,500-11,500
фруктоза	5,000-6,000
лецитин соняшниковий	2,000-2,500
L-глутамін	2,000-2,500
L-лізин	0,200-0,250
аскорбінова кислота	0,200-0,250
екстракт кореня цикорію	0,150-0,200
рутин	0,160-0,180
кальцію лактат	0,045-0,500
магнію цитрат	0,045-0,500
глюкозаміну гідрохлорид	0,040-0,450
коензим Q10	0,010-0,015
глюконат цинку	0,010-0,015
бета-каротин	0,006
рибофлавін	0,002
піридоксин	0,002.