

Спосіб виробництва сухої розчинної суміші на основі комбінації білка соняшникового та концентрату білкового молочної сироватки для ентерального харчування складається з чотирьох основних етапів та внесення компонентів у розрахунку на 100 кг виробу, згідно з яким: на першому етапі проводиться просіювання сировини крізь сито. На другому етапі здійснюється тритурація, що передбачає внесення рибофлавіну, піридоксину, бета-каротину, 50 г білка з порошку з насіння соняшнику і 50 г концентрату білкового молочної сироватки, їх перемішування упродовж 10-15 хв. На третьому етапі проводять попереднє змішування, при якому завантажують по 24,0 кг білка з порошку з насіння соняшнику і концентрату білкового молочної сироватки, коензим Q10, глюконат цинку та суміш, що отримана в результаті попередньої тритурації, і змішують упродовж 15-20 хв. На четвертому етапі у змішувач із сумішшю, отриманою після попереднього змішування, додають решту передбаченої кількості білка з порошку з насіння соняшнику і концентрату білкового молочної сироватки, цукор кристалічний, середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер, фруктозу, лецитин соняшниковий, L-глутамін, аскорбінову кислоту, екстракт кореня цикорію, рутин, кальцію лактат, магнію цитрат, глюкозаміну гідрохлорид і перемішують протягом 15-20 хв. При цьому рецептурні компоненти для приготування суміші беруть у наступних співвідношеннях, мас. %:

цукор кристалічний	39,500-40,500
білок із порошку з насіння соняшнику	21,000-22,000
концентрат білковий молочної сироватки	20,000-21,000
середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер	10,500-11,000
фруктоза	3,000-5,000
лецитин соняшниковий	2,000-2,500
L-глутамін	1,400-2,500
аскорбінова кислота	0,200-0,250
екстракт кореня цикорію	0,180-0,220
рутин	0,160-0,180
кальцію лактат	0,045-0,500
магнію цитрат	0,045-0,500
глюкозаміну гідрохлорид	0,035-0,450
коензим Q10	0,010-0,015
глюконат цинку	0,010-0,015
бета-каротин	0,006
рибофлавін	0,002
піридоксин	0,002.