

Спосіб виробництва сухої розчинної суміші на основі ізоляту білка молочної сироватки для ентєрального харчування осіб, які мають дисфункції вуглеводного обміну, складається з чотирьох основних етапів та внесення компонентів у розрахунку на 100 кг виробу, згідно з яким: на першому етапі проводиться просіювання сировини крізь сито, на другому етапі здійснюється тритурація, що передбачає внесення рибофлавіну, піридоксину, бета-каротину і 100 г ізоляту білка молочної сироватки, їх перемішування протягом 10-15 хв, на третьому етапі проводять попереднє змішування, при якому завантажуються 48,0 кг ізоляту білка молочної сироватки, коензим Q10, глюконат цинку та суміш, що отримана в результаті попередньої тритурації, і змішують протягом 15-20 хв, на четвертому етапі у змішувач із сумішшю, отриманою після попереднього змішування, додають решту передбаченої кількості ізоляту білка молочної сироватки, ізомальтулозу, середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер, фруктозу, L-глутамін, лецитин соняшниковий, інουλін, L-гліцин, екстракт ромашки лікарської, екстракт кореня цикорію, аскорбінову кислоту, рутин, кальцію лактат, магнію цитрат, глюкозаміну гідрохлорид і перемішують протягом 15-20 хв.