

Спосіб виробництва сухої розчинної суміші на основі ізоляту білка молочної сироватки для ентерального харчування, що включає чотири основні етапи згідно яких вносять компоненти з розрахунку на 100 кг виробу: на першому етапі просіюють сировину крізь сито, на другому етапі тритурують, що передбачає внесення рибофлавіну, піридоксину, бета-каротину і 100 г ізоляту білка молочної сироватки, їх перемішують упродовж 10-15 хв, на третьому етапі попередньо змішують, при якому завантажують 48,0 кг ізоляту білка молочної сироватки, коензим Q10, глюконат цинку та суміш, що отримують в результаті попередньої тритурації, і змішують упродовж 15-20 хв, на четвертому етапі у змішувач із сумішшю, отриманою після попереднього змішування, додають решту передбаченої кількості ізоляту білка молочної сироватки, цукор кристалічний, середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер, фруктозу, L-глутамін, лецитин соняшниковий, інουλін, L-гліцин, екстракт ромашки лікарської, аскорбінову кислоту, екстракт кореня цикорію, рутин, глюкозаміну гідрохлорид, хондроїтину сульфат, кальцію лактат, магнію цитрат і перемішують протягом 15-20 хв, при цьому рецептурні компоненти для приготування заявленої суміші беруть у наступних співвідношеннях, мас. %:

цукор кристалічний	41,000-42,000
ізолят білка молочної сироватки	22,000-24,000
середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер	12,500-13,000
фруктоза	8,000-9,000
L-глутамін	7,000-8,000
лецитин соняшниковий	2,000-3,000
інουλін	1,500-2,000
L-гліцин	0,800-1,250
екстракт ромашки лікарської	0,400-0,500
аскорбінова кислота	0,200-0,250
екстракт кореня цикорію	0,100-0,200
рутин	0,140-0,160
глюкозаміну гідрохлорид	0,045-0,055
хондроїтину сульфат	0,040-0,050
кальцію лактат	0,040-0,050
магнію цитрат	0,040-0,050
коензим Q10	0,010-0,015
глюконат цинку	0,010-0,015
бета-каротин	0,006-0,008
рибофлавін	0,015-0,002
піридоксин	0,015-0,002.