

Спосіб виробництва сухої розчинної суміші на основі комбінації білка конопляного та концентрату білкового молочної сироватки для ентерального харчування складається з чотирьох основних етапів та внесення в компонентів у розрахунку на 100 кг виробу, згідно якого: на першому етапі проводять просіювання сировини крізь сито. На другому етапі здійснюють тритурацію, що включає внесення рибофлавіну, піридоксину, бета-каротину, 50 г білка з насіння конопель і 50 г концентрату білкового молочної сироватки, їх перемішування упродовж 10-15 хв. На третьому етапі проводять попереднє змішування, при якому завантажують по 24,0 кг білка з насіння конопель і концентрату білкового молочної сироватки, коензим Q10, глюконат цинку та суміш, що отримують в результаті попередньої тритурації і змішують упродовж 15-20 хв. На четвертому етапі у змішувач із сумішшю отриманою після попереднього змішування, додають решту передбаченої кількості білка з насіння конопель і концентрату білкового молочної сироватки, цукор кристалічний, середньоланцюгові тригліцериди рослинного походження з олії пальмових ядер, фруктозу, лецитин соняшниковий, L-глутамін, аскорбінову кислоту, екстракт кореня цикорію, рутин, кальцію лактат, магнію цитрат, глюкозаміну гідрохлорид і перемішують протягом 15-20 хв.