

1. Спосіб одержання композиції з протизапальною та протимікробною дією, що включає змішування протизапального ферменту серратіопептидази з принаймні одним рослинним екстрактом, який **відрізняється** тим, що як рослинний екстракт в композицію вводять рослинний екстракт, що вибирають з групи, яка містить екстракт чебрецю, екстракт вербени та екстракт бузини.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять екстракт плодів бузини.
3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять екстракт чебрецю *Thymus vulgaris* L., екстракт трави вербени *Verbena officinalis* L. та екстракт плодів бузини *Sambucus nigra* L.
4. Спосіб за п. 3, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять від 1 до 10 мас. % серратіопептидази та від 20 до 70 мас. % - екстракту чебрецю *Thymus vulgaris* L., екстракту трави вербени *Verbena officinalis* L. та екстракту плодів бузини *Sambucus nigra* L.
5. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять 1,8 мас. % серратіопептидази.
6. Спосіб за п. 4, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять 17,5 мас. % екстракту чебрецю *Thymus vulgaris* L.
7. Спосіб за п. 4, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять 8,8 мас. % екстракту трави вербени *Verbena officinalis* L.
8. Спосіб за п. 4, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять 8,8 мас. % екстракту плодів бузини *Sambucus nigra* L.
9. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять звичайні допоміжні агенти.
10. Спосіб за п. 9, який **відрізняється** тим, що композицію формують у таблетку, капсулу, пігулку або порошок.