

1. Спосіб одержання дієтичної добавки для підтримки кислотно-лужного балансу шлункового соку, за яким змішують кальцію карбонат, магнію карбонат, магнію стеарат, цукор білий кристалічний, крохмаль кукурудзяний та харчовий ароматизатор, гранулюють та пресують в таблетки, який **відрізняється** тим, що до дієтичної добавки на стадії змішування компонентів додатково вводять гуміарабік та лимонну кислоту.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що змішують карбонат магнію, карбонат кальцію, магнію стеарат, цукор білий кристалічний, крохмаль кукурудзяний, харчовий ароматизатор, гуміарабік та лимонну кислоту, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

кальцію карбонат	40,0-60,0
магнію карбонат	4,0-8,0
магнію стеарат	0,5-1,5
цукор білий кристалічний	35,0-45,0
крохмаль кукурудзяний	1,5-3,0
харчовий ароматизатор	0,05-0,2
гуміарабік	0,5-1,5
лимонна кислота	0,1-0,8.

3. Спосіб за п. 2, який **відрізняється** тим, що змішують кальцію карбонат, магнію карбонат, магнію стеарат, цукор білий кристалічний, олію м'ятну, крохмаль кукурудзяний, харчовий ароматизатор, гуміарабік та лимонну кислоту, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

кальцію карбонат	50,0
магнію карбонат	6,0
магнію стеарат	1,0
цукор білий кристалічний	39,45
крохмаль кукурудзяний	2,3
харчовий ароматизатор	0,1
гуміарабік	0,9
лимонна кислота	0,25.

4. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що цукор білий кристалічний вводять у формі цукрової пудри.

5. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що як гуміарабік вводять акацію.