

Спосіб отримання засобу у формі гелевої композиції з аторвастатином для лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, який **відрізняється** тим, що до 1 частини карбомеру 980 додають воду очищену до 50 частин, перемішують і залишають для гелеутворення протягом 3-4 годин; в іншу ємність вносять 1,2 частини аторвастину кальцію, додають 10 частин 96 % етанолу до утворення суспензії, яка після додавання 12 частин 1,2-пропіленгліколю перетворюється у розчин; додатково в іншій ємності 10 частин ксилітолу розчиняють в 17 частинах води очищеної; до утвореної гелеподібної маси з вмістом 2 % карбомеру додають 0,5 частини 20 % розчину і спиртово-пропіленгліколевий розчин хлоргексидину біглюконату аторвастатину, а також 27 частин концентрованого розчину ксилітолу, і краплями додають триетаноламін, перемішуючи, до величини рН 5,3, при цьому отримують засіб з наступним співвідношенням компонентів, мас. %:

аторвастатин кальцію	1,2
20 % хлоргексидину	
біглюконат	0,5
ксилітол	10
Карбомер-980	1
1,2-пропіленгліколь	12
етанол 96 %	10
триетаноламін	до рН 5,2-7,0
вода очищена	до 100.