

Спосіб отримання засобу у формі гелевої композиції з аторвастатином для лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. До 1 частини карбомеру 980 додають воду очищену до 50-ти частин, перемішують і залишають для гелеутворення протягом 3-4 годин; в іншу ємність вносять 1,2 частини аторвастину кальцію, додають 10 частин 96 % етанолу до утворення суспензії, яка після додавання 12-ти частин 1,2-пропіленгліколю перетворюється у розчин. Додатково в іншій ємності 10 частин ксилітолу розчиняють в 17-ти частинах води очищеної. До утвореної гелеподібної маси з вмістом 2 % карбомеру додають 0,5 частини 20 % розчину і спиртово-пропіленгліколевий розчин хлоргексидину біглюконату аторвастатину, а також 27 частин концентрованого розчину ксилітолу і краплями додають триетаноламін, перемішуючи, до величини рН 5,3. При цьому отримують засіб з наступним співвідношенням компонентів, мас. %:

аторвастатин кальцію	1,2
20 % хлоргексидину	0,5
біглюконат	
ксилітол	10
карбомер 980	1
1,2-пропіленгліколю	12
етанол 96 %	10
триетаноламін	до рН
	5,2-7,0
вода очищена	до 100 .