

1. Спосіб контролю ґрунтового шкідника польової культури, що включає етап протруювання, на якому насіння вказаної польової культури протруюють азадирахтином А, де польова культура являє собою кукурудзу, і ґрунтовий шкідник являє собою личинку західного кукурудзяного кореневого жука.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що насіння протруюють за дози азадирахтину А, що становить 0,022-0,7 мг/насінина.
3. Спосіб за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що насіння протруюють за дози азадирахтину А, що становить 1,54-49 г/га.
4. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що вказаний етап протруювання також включає протруювання насіння азадирахтином В, де азадирахтин В перебуває в комбінації з азадирахтином А, де масове співвідношення азадирахтину А і азадирахтину В становить 2,5:1-10:1, і де насіння протруюють азадирахтином А та азадирахтином В переважно за сумарної дози, що становить 0,022-0,7 мг/насінина.
5. Спосіб за п. 1 або 4, який **відрізняється** тим, що вказаний етап протруювання також включає протруювання насіння азадирахтином В, де азадирахтин В перебуває в комбінації з азадирахтином А, де масове співвідношення азадирахтину А і азадирахтину В становить 2,5:1-10:1, і де насіння протруюють азадирахтином А та азадирахтином В за сумарної дози, що становить 1,54-49 г/га.
6. Спосіб контролю ґрунтового шкідника польової культури, що включає наступні етапи: щодо насіння польової культури застосовують ефективну кількість азадирахтину А або азадирахтину А і азадирахтину В шляхом протруювання насіння, та здійснюють посів протруєного насіння, причому польова культура являє собою кукурудзу, і при цьому ґрунтовий шкідник являє собою личинку західного кукурудзяного кореневого жука.
7. Спосіб за п. 6, який **відрізняється** тим, що азадирахтин А застосовують щодо насіння кукурудзи у кількості, що становить 0,022-0,7 мг/насінина.
8. Спосіб за п. 6 або 7, який **відрізняється** тим, що азадирахтин А застосовують за дози, що становить 1,54-49 г/га.
9. Спосіб за п. 6, який **відрізняється** тим, що щодо насіння кукурудзи застосовують азадирахтин А та азадирахтин В, і масове співвідношення азадирахтину А і азадирахтину В становить 2,5:1-10:1.
10. Спосіб за п. 6 або 9, який **відрізняється** тим, що азадирахтин А та азадирахтин В застосовують за сумарної дози, що становить 0,022-0,7 мг/насінина.
11. Спосіб за будь-яким із пп. 6, 9 або 10, який **відрізняється** тим, що азадирахтин А та азадирахтин В застосовують за сумарної дози, що становить 1,54-49 г/га.