



1. Спосіб боротьби з комахами, що включає стадію нанесення на насіння сполуки, представленої наступною формулою (II) або (III):



у формулі (II) подвійний стереозв'язок карбон-карбон має E-форму, Z-форму або є їх сумішшю,



де насінням є насіння кукурудзи або насіння ріпаку, і
комахи є видом *Agriotes* або видом *Phyllotreta*.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що, коли насінням є насіння кукурудзи, комахами є вид *Agriotes*, а коли насінням є насіння ріпаку, комахами є вид *Phyllotreta*.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що стадію нанесення проводять шляхом нанесення покриття на насіння, де покриття містить сполуку, представлену згаданою вище формулою (II) або (III).

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що сполука, представлена формулою (II) або (III), використовується тільки як інсектицид.

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який **відрізняється** тим, що кількість сполуки, представленої формулою (II) або (III), в покритті становить від 0,05 г до 1,5 г/кг насіння.

6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який **відрізняється** тим, що стадію нанесення покриття проводять шляхом виконання наступних стадій у такому порядку:


А) прокладання борозни в обробленій землі;

Б) засівання борозни насінням;


В) нанесення на борозну композиції, що містить сполуку, представлену формулою (II) або (III); і

Г) закриття борозни.

7. Насіння, вкрите сполукою, представленою формулою (II) або (III):



у формулі (II) подвійний стереозв'язок карбон-карбон має E-форму, Z-форму або є їх сумішшю,



де насінням є насіння кукурудзи або насіння ріпаку.

8. Насіння за п. 7, яке **відрізняється** тим, що насінням є насіння кукурудзи для контролю виду *Agriotes* або насіння ріпаку для контролю виду *Phyllotreta*.