


1. Сполука формули (I):

TL-L_a-CE-HD, (I)

або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

i) TL являє собою фрагмент формул (IIa), (IIb), (IIIa), (IIIb), (IIIc) або (IIId):



де:

кожен з Q₁, Q₂, Q₃, Q₄, Q₅, Q₆ і Q₈, незалежно, являє собою нітроген або -CR_b-, де кожен R_b незалежно являє собою гідроген, галоген або C₁-C₅алкіл;

R₁ являє собою гідроген, -CN, C₁-C₆алкіл, циклопентил, феніл, (циклопропіл)C₁-C₆алкіл, бензил або -C(O)-R_j; де R_j являє собою -NR_mR_n або -OR_m; R_m являє собою гідроген або C₁-C₆алкіл; R_n являє собою C₁-C₆алкіл; або R_m і R_n, разом з нітрогеном, до якого вони приєднані, утворюють 1,2,3,4-тетрагідроізохінолін; і R₁ необов'язково заміщений 1-3 R_k, незалежно вибраними з фенілу і C₁-C₆галогеналкілу;

R₂ являє собою гідроген;

R₃ являє собою гідроген або C₁-C₅алкіл;


R₄ являє собою C₁-C₆алкіл, C₂-C₁₀алкеніл, циклопропіл, циклобутил, циклопентил, циклогексил, тетрагідрофураніл, тетрагідропіраніл, азетидиніл, піридазин-3(2H)-он, феніл, нафтил, піридиніл, цинолініл, ізохінолініл, хінолініл, піразоло[1,5-a]піридиніл, імідазо[1,5-a]піридиніл, бензо[b]тіофеніл, (циклопропіл)C₁-C₆алکیلну групу, (циклобутил)C₁-C₆алکیلну групу, (циклопентил)C₁-C₆алکیلну групу, бензильну групу, (тетрагідрофураніл)C₁-C₆алکیلну групу або (тетрагідропіраніл)C₁-C₆алکیلну групу; і R₄ необов'язково заміщений 1-5 R_g, незалежно вибраними з групи, що складається з гідрокси, галогену, CN, C₁-C₆алкілу, C₆-C₁₀арилу, C₁-C₆алкокси, C₁-C₆галоалкокси і C₆-C₁₀аралкокси, або два R_g разом з атомами, до яких вони приєднані, утворюють ароматичне або неароматичне від 3- до 6-членне кільце, що необов'язково містить один або два кільцеві гетероатоми, незалежно вибрані з оксигену, сульфуру або нітрогену; і

R₅ являє собою гідрокси, NH₂, C₁-C₆алкіламіно, C₁-C₆алканоїламіно або C₁-C₆алкілсульфоніламіно;

або R₄ і R₅, взяті разом з атомами карбону, до яких вони приєднані, утворюють від 3- до 6-членне гетероциклоалکیلне кільце, що містить від одного до чотирьох кільцевих гетероатомів, незалежно вибраних з оксигену, сульфуру або нітрогену; і де від 3- до 6-членне гетероциклоалکیلне кільце, необов'язково заміщене 1-5 R_g, незалежно вибраними з групи, що складається з -CN, C₁-C₆алкілу, необов'язково заміщеного фенілом або C₃-C₉циклоалкілом; C₁-C₆галогеналкілу; C₂-C₆алкенілу; C-карбоксі; C-амідо; C₃-C₉циклоалкілу; фенілу; аміно; та оксо, і/або необов'язково два R_g разом з атомом(ами), до якого(их) вони приєднані, утворюють від 3- до 6-членну неароматичну карбоциклічну групу; і

R₁₁ являє собою феніл, необов'язково заміщений C₁-C₅алкілом, C₁-C₅алкокси, C₁-C₅галоалкокси, галогеном або C₃-C₉циклоалкілом; піридин, необов'язково заміщений C₁-C₅алкілом; цинолініл; ізохінолініл; хінолініл; піразоло[1,5-a]піридиніл; імідазо[1,5-a]піридиніл; бенз[b]тіофеніл; хроманіл; 1,2,3,4-тетрагідронафтил; або нафтил;

ii) SE є фрагментом формули (IV):



де:

кожен з R_6 і R_7 незалежно вибирають з галогену; -CN; C_1 - C_5 алкілу, необов'язково заміщеного 1-5 замісниками, незалежно вибраними з гідрокси, галогену та C_1 - C_6 алкокси; або циклопропілу;

R_8 являє собою гідроген, C_1 - C_5 алкіл, ціано або галоген;


необов'язково R_7 і R_8 , взяті разом, разом з атомами карбону, до яких вони приєднані, утворюють 4-, 5- або 6-членне неароматичне карбоциклічне кільце;

Q_7 являє собою нітроген або $-CR_c-$, де R_c являє собою гідроген, галоген або C_1 - C_5 алкіл;

(TL) позначає точку, де фрагмент формули (IV) приєднаний до TL- L_a -; і

(HD) позначає точку, де фрагмент формули (IV) приєднаний до -HD;

iii) HD являє собою фрагмент формули (V):



де:

R_9 являє собою $-(C(R_d)_2)_n-N(R_d)_2$; де

кожен R_d незалежно являє собою гідроген або необов'язково заміщений C_1 - C_5 алкіл;

кожний n незалежно вибирають з 0, 1, 2, 3, 4 або 5; і


L_a незалежно являє собою зв'язок; $-(C(R_a)_2)_z-$; оксиген; сульфур; або $-NR_a-$; де:

кожен R_a незалежно являє собою гідроген або C_1 - C_5 алкіл; і

z являє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5.

2. Сполука за п. 1 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

TL являє собою фрагмент формули (IIIb):



3. Сполука за п. 1 або 2 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-(CH_2)_n-N(R_d)_2$.

4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-(CH_2)-N(R_d)_2$ або $-N(R_d)_2$.


5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-NH_2$.

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_4 являє собою $-CH-$, і Q_5 являє собою нітроген.

7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_4 являє собою C_1 - C_6 алкіл.

8. Сполука за п. 1 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

TL являє собою фрагмент формули (IIIa):




9. Сполука за п. 8 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-(CH_2)_n-N(R_d)_2$.

10. Сполука за п. 8 або 9 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-N(R_d)_2$.

11. Сполука за будь-яким з пп. 8-10 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-NH_2$.

12. Сполука за будь-яким з пп. 8-11 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_4 і R_5 , взяті разом з атомами карбону, до яких вони приєднані, утворюють піролідин, необов'язково заміщений 1-5 R_g , незалежно вибраними з групи, що складається з C_1 - C_6 алкілу і оксо, і/або, необов'язково, два R_g разом з атомом(ами), до якого(их) вони приєднані, утворюють від 3- до 6-членну неароматичну карбоциклічну групу.


13. Сполука за п. 12 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де TL являє собою фрагмент формули (IIIaa):



де кожен R_g незалежно являє собою C_1 - C_6 алкіл або два R_g разом з атомом(ами), до якого(их) вони приєднані, утворюють від 3- до 6-членну неароматичну карбоциклічну групу.

14. Сполука за п. 13 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де два R_g разом з атомом, до якого вони приєднані, утворюють циклопропілну групу, циклобутильну групу, цикlopентильну групу або циклогексильну групу.


15. Сполука за будь-яким з пп. 8-11 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де TL являє собою фрагмент формули (IIIab):



де R_g являє собою C_1 - C_6 алкіл.

16. Сполука за п. 15 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_g являє собою ізопропіл.


17. Сполука за будь-яким з пп. 8-11 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де TL являє собою фрагмент формули (IIIac):



де R_g являє собою C_1 - C_6 алкіл.

18. Сполука за п. 17 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_g являє собою метил.

19. Сполука за будь-яким з пп. 8-11 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де TL являє собою фрагмент формули (IIIad):



де кожен R_g незалежно являє собою гідроген або C_1 - C_6 алкіл.

20. Сполука за будь-яким з пп. 8-11 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_4 являє собою C_1 - C_3 алкіл.


21. Сполука за будь-яким з пп. 8-20 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_4 , Q_5 , і Q_6 являють собою $-CH-$.

22. Сполука за будь-яким з пп. 8-20 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_4 являє собою $-CH-$, і Q_5 і Q_6 являють собою нітроген.

23. Сполука за будь-яким з пп. 8-20 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_4 являє собою нітроген, і Q_5 і Q_6 являють собою $-CH-$.

24. Сполука за п. 1 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

TL являє собою фрагмент формули (IIIId):



25. Сполука за п. 24 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-(CH_2)_n-N(R_d)_2$.


26. Сполука за п. 24 або 25 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-N(R_d)_2$.

27. Сполука за будь-яким з пп. 24-26 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-NH_2$.

28. Сполука за будь-яким з пп. 24-27 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_8 являє собою $-CH-$ і Q_5 являє собою нітроген.

29. Сполука за п. 1 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

TL являє собою фрагмент формули (IIa):



30. Сполука за п. 29 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-(CH_2)_n-N(R_d)_2$.


31. Сполука за п. 29 або 30 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-N(R_d)_2$.

32. Сполука за будь-яким з пп. 29-31 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-NH_2$.

33. Сполука за будь-яким з пп. 29-32 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_3 являє собою гідроген.


34. Сполука за будь-яким з пп. 29-32 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_3 являє собою C_1 - C_5 алкіл.
35. Сполука за будь-яким з пп. 29-34 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_1 , Q_2 , і Q_3 являють собою -CH-.
36. Сполука за будь-яким з пп. 29-34 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_1 являє собою -CH-, і Q_2 і Q_3 являють собою нітроген.
37. Сполука за будь-яким з пп. 29-34 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_2 являє собою -CH-, і Q_1 і Q_3 являють собою нітроген.
38. Сполука за будь-яким з пп. 29-34 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_1 являє собою нітроген, і Q_2 і Q_3 являють собою -CH-.
39. Сполука за будь-яким з пп. 29-34 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_2 являє собою нітроген, і Q_1 і Q_3 являють собою -CH-.
40. Сполука за п. 1 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

TL являє собою фрагмент формули (IIb):



41. Сполука за п. 40 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-(CH_2)_n-N(R_d)_2$.
42. Сполука за п. 40 або 41 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-N(R_d)_2$.
43. Сполука за будь-яким з пп. 40-42 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_9 являє собою $-NH_2$.
44. Сполука за будь-яким з пп. 40-43 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_1 являє собою C_1 - C_6 алкіл.
45. Сполука за будь-яким з пп. 40-44 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_3 являє собою гідроген.
46. Сполука за будь-яким з пп. 40-44 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R_3 являє собою C_1 - C_5 алкіл.
47. Сполука за будь-яким з пп. 40-46 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_1 , Q_2 і Q_3 являють собою -CH-.
48. Сполука за будь-яким з пп. 40-46 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_1 являє собою -CH-, і Q_2 і Q_3 являють собою нітроген.
49. Сполука за п. 1 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

TL являє собою фрагмент формули (IIIc):




50. Сполука за будь-яким з пп. 1-49 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де L_a являє собою оксиген.
51. Сполука за будь-яким з пп. 1-49 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де L_a являє собою $-CH_2$ -.
52. Сполука за будь-яким з пп. 1-51 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де Q_7 являє собою -CH-.


кожен з R₆ і R₇ незалежно являє собою галоген або C₁-C₅алкіл, необов'язково заміщений 1-5 замісниками, незалежно вибраними з гідрокси, галогену і C₁-C₆алкокси; і R₈ являє собою гідроген; або


54. Сполука за будь-яким з пп. 1-52 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R₆ являє собою Cl, R₇ являє собою Cl, і R₈ являє собою гідроген.



















56. Сполука за будь-яким з пп. 1-52 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль, де R₆ являє собою галоген, і R₇ і R₈, взяті разом, разом з атомами карбону, до яких вони приєднані, утворюють 4-членне карбоциклічне кільце.






















Chemical structures 10, 14, 15, 24, 26, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 39-A a6o 39-B, 40, and 41 are shown, representing various substituted benzimidazole derivatives.














або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятна сіль.

58. Фармацевтична композиція, що містить сполуку за будь-яким з пп. 1-57 або її стереоізомер, або її таутомер, або її фармацевтично прийнятну сіль і принаймні одну фармацевтично прийнятну допоміжну речовину.

59. Спосіб лікування розладу або захворювання у суб'єкта, який цього потребує, спосіб, що включає введення суб'єкту терапевтично ефективної кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-57 або її стереоізомеру, або її таутомеру, або її фармацевтично прийнятної солі, де розлад або хвороба вибрані з неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), ожиріння, гіперліпідемії, гіперхолестеринемії, цукрового діабету, стеатозу печінки, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, гіпотиреозу, раку щитовидної залози.

60. Спосіб лікування розладу або захворювання у суб'єкта, який цього потребує, спосіб, що включає введення суб'єкту терапевтично ефективної кількості фармацевтичної композиції за п. 58, де розлад або хвороба вибрані з неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), ожиріння, гіперліпідемії, гіперхолестеринемії, цукрового діабету, стеатозу печінки, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, гіпотиреозу та раку щитовидної залози.

61. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-57 або її стереоізомеру, або її таутомеру, або її фармацевтично прийнятної солі, для виробництва лікарських засобів для лікування розладу або захворювання, вибраного з неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), ожиріння, гіперліпідемії, гіперхолестеринемії, цукрового діабету, стеатозу печінки, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, гіпотиреозу та раку щитовидної залози.

62. Спосіб лікування розладу, пов'язаного з рецепторами гормону щитовидної залози у пацієнта, який включає стадії:

виявлення пацієнта, який потребує лікування розладу, пов'язаного з рецепторами гормонів щитовидної залози, і введення пацієнту або контактування пацієнта зі сполукою за будь-яким з пп. 1-57 або її стереоізомером, або її таутомером, або її фармацевтично прийнятною сіллю.

63. Спосіб лікування розладу, пов'язаного з рецепторами гормону щитовидної залози у пацієнта, який включає стадії:

виявлення пацієнта, який потребує лікування розладу, пов'язаного з рецепторами гормонів щитовидної залози, і введення пацієнту або контактування пацієнта з фармацевтичною композицією за п. 58.

64. Спосіб за п. 62 або 63, де розлад рецептора гормону щитовидної залози вибирають з неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), ожиріння, гіперліпідемії, гіперхолестеринемії, діабету, стеатозу печінки, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, гіпотиреозу та раку щитовидної залози.

65. Спосіб селективної модуляції активності бета-рецепторів гормонів щитовидної залози (THR-β) у пацієнта, який страждає на захворювання або розлад, вибраний з неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ), ожиріння, гіперліпідемії, гіперхолестеринемії, цукрового діабету, стеатозу печінки, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, гіпотиреозу та раку щитовидної залози, спосіб, що включає контактування сполуки за будь-яким з пп. 1-57 або її

стереоізомеру, або її таутомеру, або її фармацевтично прийнятної солі з рецептором гормону щитовидної залози.