

1. Фармацевтичний склад вітаміну D у вигляді сферонізованих гранул із пролонгованим вивільненням для перорального застосування, що містить від 0,01 до 1 мас. % сполуки вітаміну D, яка являє собою 25-гідроксивітамін D і/або кальцифедіол, дисперговані в полімерній композиції, яка є нерозчинною у воді та є водопроникною, яка містить від 1 до 20 мас. % етилцелюлози, від 30 до 50 мас. % добавки для сферонізації, що містить мікрокристалічну целюлозу, від 1 до 20 мас. % підсилювача всмоктування, що містить C8-C10-тригліцериди, і від 1 до 15 мас. % зв'язувальної речовини, що являє собою простий ефір целюлози, який включає гідроксипропілметилцелюлозу з низькою в'язкістю, що має в'язкість 2 % водного середовища за 20 °C від 2 до 6 сП, де гранула має розмір частинок у діапазоні від 500 мкм до 2,8 мм.
2. Склад за п. 1, який **відрізняється** тим, що сполука на основі вітаміну D являє собою кальцифедіол.
3. Склад за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що гранули мають розмір частинок у діапазоні від 250 мкм до 2,8 мм.
4. Склад за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що гранули мають розмір частинок в діапазоні від 250 мкм до 2 мм.
5. Фармацевтичний склад у вигляді сферонізованих гранул із пролонгованим вивільненням, що містить 25-гідроксивітамін D у кількості від 0,01 до 1 мас. %, диспергований в етилцелюлозі, що міститься в кількості від 1 до 10 мас. %, і що додатково містить середньоланцюгові тригліцериди в кількості від 1 до 15 мас. %, добавку для сферонізації у кількості від 40 до 60 мас. %, що являє собою мікрокристалічну целюлозу, і зв'язувальну речовину в кількості від 1 до 15 мас. %, що являє собою гідрофільний простий ефір целюлози з низькою в'язкістю, що має в'язкість 2 % водного середовища при 20 °C від 2 сП до 6 сП.
6. Склад за п. 5, який **відрізняється** тим, що додатково містить один або більше моно-, ді- і три-ацилгліцеридів бегенової кислоти.
7. Склад за п. 5 або 6, який **відрізняється** тим, що гранули мають розмір частинок у діапазоні від 250 мкм до 2,8 мм.
8. Склад за будь-яким із пп. 5-7, який **відрізняється** тим, що гранули мають розмір частинок в діапазоні від 250 мкм до 2 мм.
9. Пероральна лікарська форма, яка містить склад за будь-яким із пп. 1-4.
10. Пероральна лікарська форма з п. 9, яка **відрізняється** тим, що склад розміщений в оболонці капсули.
11. Пероральна лікарська форма за п. 9, яка **відрізняється** тим, що склад розміщений у саше.

12. Пероральна лікарська форма, яка містить склад за будь-яким із пп. 5-8.
13. Пероральна лікарська форма за п. 12, яка **відрізняється** тим, що склад розміщений у саше.
14. Застосування складу за будь-яким із пп. 1-8 для одержання лікарського засобу для лікування захворювання або стану, сприйнятливості до вітаміну D.
15. Застосування за п. 14, яке **відрізняється** тим, що лікарський засіб призначений для лікування пацієнта дитячого віку або пацієнта літнього віку.
16. Застосування за п. 14, яке **відрізняється** тим, що лікарський засіб призначений для введення способом, який включає розсіпання складу на субстрат перед пероральним прийманням усередину складу та субстрату.
17. Застосування за п. 14, яке **відрізняється** тим, що лікарський засіб призначений для введення способом, який включає диспергування складу в суспендуючій основі перед пероральним прийманням усередину складу та суспендуючої основи.
18. Застосування за будь-яким із пп. 14-17, яке **відрізняється** тим, що лікарський засіб лікує пацієнта, що страждає на гіперпаратиреоз, викликаний хронічною хворобою нирок.