

1. Спосіб одержання концентрованого інсектицидного протруювача насіння, що включає клотіанідин та біфентрин та допоміжні речовини, який **відрізняється** тим, що клотіанідин вводять в композицію в кількості від 40,0 до 50,0 мас. %, біфентрин вводять в композицію в кількості від 5,0 до 15,0 мас. %, а решту складають допоміжні речовини.

2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що клотіанідин вводять в композицію в кількості 42,60 мас. %.

3. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що біфентрин вводять в композицію в кількості 10,26 мас. %.

4. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що як допоміжні речовини в композицію вводять принаймні один емульгатор, стабілізатор, піногасник, антифриз, загусник, регулятор рН, барвник та розріджувач.

5. Спосіб за п. 4, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять: як емульгатор - суміш поверхнево-активних речовин (ПАР), що містить поліоксіетиленовий етер фенетилфенолсульфату та амінову сіль C₁₁-C₁₄алкілбензенсульфонової кислоти, як стабілізатор - лігносульфонат натрію та алюмосилікат магнію, як піногасник - полідиметилсилоксан, як антифриз - етиленгліколь, як загусник - камедь, як регулятор рН - оцтову кислоту, як барвник - пігмент 3-гідрокси-2'-метил-2-нафтанілід, та як розріджувач - воду.

6. Спосіб за п. 5, який **відрізняється** тим, що вводять клотіанідин, біфентрин, суміш ПАР, лігносульфонат натрію, алюмосилікат магнію, полідиметилсилоксан, етиленгліколь, камедь, оцтову кислоту, 3-гідрокси-2'-метил-2-нафтанілід та воду, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

клотіанідин	40,0-50,0
біфентрин	5,0-15,0
суміш ПАР	3,0-9,0
лігносульфонат натрію	0,1-1,0
алюмосилікат магнію	0,1-1,0
полідиметилсилоксан	0,1-1,0
етиленгліколь	3,0-8,0
камедь	0,1-1,0
оцтова кислота	0,05-0,15
3-гідрокси-2'-метил-2-нафтанілід	3,0-9,0
вода	решта.

7. Спосіб за п. 5, який **відрізняється** тим, що в композицію вводять клотіанідин, біфентрин, суміш ПАР, лігносульфонат натрію, алюмосилікат магнію, полідиметилсилоксан, етиленгліколь, камедь, оцтову кислоту, 3-гідрокси-2'-метил-2-нафтанілід та воду, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

клотіанідин	42,60
біфентрин	10,26
суміш ПАР	4,80
лігносульфонат натрію	0,40
алюмосилікат магнію	0,64
полідиметилсилоксан	0,16
етиленгліколь	4,00
камедь	0,08
оцтова кислота	0,12
3-гідрокси-2'-метил-2-нафтанілід	5,56
вода	решта.