

1. Ценсавудин для лікування атаксії-телеангіектазії у суб'єкта, який потребує цього.
2. Ценсавудин за п. 1 для лікування атаксії-телеангіектазії.
3. Ценсавудин за п. 1 або 2, де ценсавудин вводять суб'єкту один раз на день.
4. Ценсавудин за п. 1 або 2, де ценсавудин вводять суб'єкту два рази на день.
5. Ценсавудин за п. 1 або 2, де ценсавудин вводять суб'єкту три рази на день.
6. Ценсавудин за п. 1 або 2, де ценсавудин вводять суб'єкту чотири рази на день.
7. Ценсавудин за будь-яким з пп. 1-6, де від 1 до 500 мг ценсавудину вводять суб'єкту як разову дозу.
8. Ценсавудин за п. 7, де від 1 до 250 мг ценсавудину вводять суб'єкту як разову дозу.
9. Ценсавудин за п. 8, де від 1 до 100 мг ценсавудину вводять суб'єкту як разову дозу.
10. Ценсавудин за будь-яким з пп. 1-9, причому лікування додатково включає введення суб'єкту одного або більше необов'язкових терапевтичних агентів.
11. Ценсавудин за будь-яким з пп. 1-10, причому зазначений суб'єкт (а) не інфікований вірусом ВІЛ, (b) не підозрюється в інфікуванні вірусом ВІЛ, та/або (c) не проходить лікування для запобігання інфікуванню вірусом ВІЛ.
12. Набір для лікування атаксії-телеангіектазії у суб'єкта, що містить ценсавудин та інструкції.
13. Набір за п. 12, який додатково містить один або більше необов'язкових терапевтичних агентів.
14. Набір за п. 12 або 13, причому зазначений суб'єкт (а) не інфікований вірусом ВІЛ, (b) не підозрюється в інфікуванні вірусом ВІЛ, та/або (c) не проходить лікування для запобігання інфікуванню вірусом ВІЛ.