

1. Сполука для використання у лікуванні холангіопатії у суб'єкта, який не переносить або має неадекватну реакцію на щонайменше одне з обетихолевої кислоти та фібрату, де сполука являє собою дигідрат солі L-лізину селадельпару.
2. Сполука для використання за п. 1, причому сполуку вводять перорально.
3. Сполука для використання за п. 1 або 2, причому кількість сполуки еквівалентна 0,5-50 мг/добу селадельпару.
4. Сполука для використання за п. 3, причому кількість сполуки еквівалентна 1-25 мг/добу селадельпару.
5. Сполука для використання за п. 4, причому кількість сполуки еквівалентна 2-10 мг/добу селадельпару.
6. Сполука для використання за п. 5, причому кількість сполуки еквівалентна 5 або 10 мг/добу селадельпару.
7. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-6, причому сполуку вводять один раз на добу.
8. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою первинний біліарний холангіт.
9. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою первинний склерозуючий холангіт.
10. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою прогресуючий сімейний внутрішньопечінковий холестаз.
11. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою синдром Алажілля.
12. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою холангіопатію, пов'язану з кістозним фіброзом.
13. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою аутоімунний холангіт.
14. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-7, причому холангіопатія являє собою реакцію "трансплантат проти хазяїна", що уражає печінку.
15. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-14, причому суб'єкт не отримувал урсодезоксихолевої кислоти.
16. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-14, причому суб'єкт не переносить або має неадекватну реакцію на урсодезоксихолеву кислоту.
17. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-16, причому суб'єкт не переносить або має неадекватну реакцію на обетихолеву кислоту.

18. Сполука для використання за будь-яким з пп. 1-17, причому суб'єкт не переносить або має неадекватну реакцію на фібрat.