




1. Сполука, вибрана з:




,



,




та




,

або її фармацевтично прийнятна сіль.


2. Сполука за п. 1, вибрана з:




,



,




та



,


або її фармацевтично прийнятна сіль.

3. Сполука за п. 2, де згадана сполука являє собою:



або її фармацевтично прийнятна сіль.

4. Сполука за п. 3, яка являє собою трет-бутиламінову сіль:



5. Фармацевтична композиція, що містить сполуку або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким із пп. 1-4 і щонайменше один фармацевтично прийнятний носій, розріджувач або наповнювач.

6. Спосіб лікування цукрового діабету 2 типу у ссавця, який включає введення ссавцю ефективної кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-4 або її фармацевтично прийнятної солі.

7. Спосіб зниження рівня глюкози в крові у ссавців, який включає введення ефективної кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-4 або її фармацевтично прийнятної солі.

8. Спосіб лікування гіперглікемії у ссавця, який включає введення ссавцю ефективної кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацевтично прийнятної солі.

9. Спосіб за будь-яким з пп. 6-8, який **відрізняється** тим, що згадану сполуку вводять пероральним шляхом.

10. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із пп. 1-4 для застосування в терапії.

11. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із пп. 1-4 для застосування в лікуванні цукрового діабету 2 типу.

12. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із пп. 1-4 для застосування в

зниженні рівня глюкози в крові.

13. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із пп. 1-4 для застосування в лікуванні гіперглікемії.

14. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування за будь-яким з пп. 10-13, при цьому сполуку мають вводити пероральним шляхом.

15. Застосування сполуки або її фармацевтично прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-4 у виробництві лікарського засобу для лікування цукрового діабету 2 типу.

16. Застосування сполуки або її фармацевтично прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-4 у виробництві лікарського засобу для зниження рівня глюкози в крові.

17. Застосування сполуки або її фармацевтично прийнятної солі за будь-яким із пп. 1-4 у виробництві лікарського засобу для лікування гіперглікемії.