

1. Спосіб лікування симптомів, пов'язаних з алергічним ринітом, у суб'єкта-людини дитячої вікової категорії віком від 2 до 11 років, що потребує цього, який включає назальне введення два рази на добу у вигляді одного впорскування у кожную ніздрю фармацевтичної композиції з фіксованою дозою, що містить мометазону фуруат й олопатадину гідрохлорид, причому (i) фармацевтична композиція містить (a) 0,025 % мас./мас. мометазону фуруату у формі частинок з середнім розміром частинок від 1 до 20 мкм, (b) 0,665 % мас./мас. олопатадину гідрохлориду у розчиненій формі та (c) гідроколоїд у концентрації від 0,1 до 3 % мас./мас., і (ii) кожне впорскування містить близько 25 мкг мометазону фуруату та близько 665 мкг олопатадину гідрохлориду.
2. Спосіб за п. 1, за яким симптоми вибрані з назальних симптомів і неназальних симптомів.
3. Спосіб за п. 1, за яким неназальні симптоми вибрані із сверблячки або печіння в очах, сльозотечі або сльозових очей, почервоніння очей, сверблячки у вухах чи піднебінні, кашлю, свербіння очей, надлишкової сльозотечі, головного болю, стомлюваності та нездужання.
4. Спосіб за п. 2, за яким назальні симптоми вибрані із закладеності носа, ринореї, свербіння та чхання.
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, за яким вік суб'єкта-людини дитячої вікової категорії становить від 2 до 5 років.
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, за яким вік суб'єкта-людини дитячої вікової категорії становить від 6 до 11 років.
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, за яким алергічний риніт вибраний з сезонного алергічного риніту, цілорічного алергічного риніту та персистуючого алергічного риніту.
8. Спосіб за п. 7, за яким алергічний риніт являє собою сезонний алергічний риніт.
9. Спосіб за п. 7, за яким алергічний риніт являє собою цілорічний алергічний риніт.
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, за яким введення фармацевтичної композиції забезпечує полегшення одного або більше симптомів алергічного риніту протягом 15 хвилин після введення.
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-9, за яким введення фармацевтичної композиції забезпечує полегшення одного або більше симптомів алергічного риніту протягом 10 хвилин після введення.
12. Спосіб забезпечення більш швидкого початку дії для полегшення алергічного риніту у суб'єкта-людини дитячої вікової категорії віком від 2 до 11 років, що потребує цього, який включає назальне введення суб'єкту два рази на добу у вигляді одного впорскування у кожную ніздрю фармацевтичної композиції з фіксованою дозою, що містить мометазону фуруат й олопатадину гідрохлорид, причому

- (i) фармацевтична композиція містить (a) 0,025 % мас./мас. мометазону фууроату у формі частинок з середнім розміром частинок від 1 до 20 мкм, (b) 0,665 % мас./мас. олопатадину гідрохлориду у розчиненій формі та (c) гідроколоїд у концентрації від 0,1 до 3 % мас./мас.,
- (ii) кожне впорскування містить близько 25 мкг мометазону фууроату та близько 665 мкг олопатадину гідрохлориду,
- (iii) введення забезпечує полегшення одного або більше симптомів алергічного риніту швидше, ніж назальне введення 25 мкг мометазону фууроату або 665 мкг олопатадину гідрохлориду в монотерапії.