

1. Спосіб лікування вітиліго у пацієнта, який включає топічне нанесення на уражену ділянку шкіри пацієнта, який потребує цього, фармацевтичної композиції, яка містить 1,5 % мас./мас. фосфату руксолітинібу в перерахунку на вільну основу, двічі на добу, за яким: введення здійснюють протягом щонайменше 52 тижнів, уражена ділянка шкіри включає щонайменше одне з нижніх кінцівок, тулуба і ступенів пацієнта, пацієнт не отримує фототерапії під час введення фармацевтичної композиції, і через 52 тижні введення пацієнт досягає 25 % або більшого покращення індексу поширеності вітиліго на ураженій ділянці шкіри, яка є щонайменше одним з нижніх кінцівок, тулуба і ступень.
2. Спосіб за п. 1, за яким вітиліго є генералізованим вітиліго.
3. Спосіб за п. 1, за яким уражена ділянка шкіри являє собою нижні кінцівки пацієнта.
4. Спосіб за п. 1, за яким уражена ділянка шкіри являє собою тулуб пацієнта.
5. Спосіб за п. 1, за яким уражена ділянка шкіри являє собою ступні пацієнта.
6. Спосіб за п. 1 або 2, за яким пацієнт досягає 50 % або більшого покращення індексу поширеності вітиліго на ураженій ділянці шкіри.
7. Спосіб за п. 1 або 2, за яким пацієнт досягає 75 % або більшого покращення індексу поширеності вітиліго на ураженій ділянці шкіри.
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, за яким пацієнт досягає 50 % або більшого покращення балів індексу поширеності вітиліго на ступнях на такий тиждень: 4, 8, 18, 24, 32, 38, 42, 48 або 52.
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, за яким пацієнт досягає 50 % або більшого покращення балів індексу поширеності вітиліго на нижніх кінцівках на такий тиждень: 4, 8, 18, 24, 32, 38, 42, 48 або 52.
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, за яким пацієнт досягає 50 % або більшого покращення балів індексу поширеності вітиліго на тулубі на такий тиждень: 4, 8, 18, 24, 32, 38, 42, 48 або 52.
11. Спосіб за п. 1, за яким:
пацієнт страждає на генералізоване вітиліго з депігментованою ділянкою:
(i) 0,5 % або більше площі поверхні тіла (BSA) на обличчі;
(ii) 3 % або більше BSA на нелицьових ділянках; і
(iii) BSA, що не перевищує 10 %, на всьому тілі; і
пацієнт досягає 50 % або більшого покращення балів індексу поширеності вітиліго на ураженій ділянці шкіри.

12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, за яким пацієнт має не більше ніж 10 % загальної площі поверхні тіла, ураженої вітиліго (T-BSA).
13. Спосіб за будь-яким із пп. 1-12, за яким у пацієнта клінічно діагностоване вітиліго.
14. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, за яким пацієнт має вік 12 років або більше.
15. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, за яким пацієнт має вік 18 років або більше.
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, за яким вік пацієнта становить від 18 до 75 років.
17. Спосіб за будь-яким із пп. 1-13, за яким пацієнт має вік 50 років або менше.
18. Спосіб за будь-яким із пп. 1-17, за яким пацієнт має прогресуюче вітиліго на вихідному рівні.
19. Спосіб за будь-яким із пп. 1-18, за яким пацієнт має тривалість захворювання на вихідному рівні щонайменше 10 років.
20. Спосіб за будь-яким із пп. 1-19, за яким пацієнту не вводять будь-яких інших засобів для лікування вітиліго.
21. Спосіб за будь-яким із пп. 1-20, за яким пацієнта раніше піддавали фототерапії.
22. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21, за яким рівень гемоглобіну пацієнта на 52 тижні схожий з рівнем гемоглобіну пацієнта на вихідному рівні.
23. Спосіб за будь-яким із пп. 1-22, за яким рівень тромбоцитів пацієнта на 52 тижні схожий з рівнем тромбоцитів пацієнта на вихідному рівні.
24. Спосіб за будь-яким із пп. 1-23, за яким не спостерігають значущих відмінностей відповіді між пацієнтами, які мають вихідну загальну площу поверхні тіла, ураженої вітиліго, що дорівнює 20 % або менше, і пацієнтами, що мають вихідну загальну площу поверхні тіла, ураженої вітиліго, більше ніж 20 %.
25. Спосіб за будь-яким із пп. 1-24, за яким фармацевтична композиція є кремом.
26. Спосіб за п. 25, за яким крем є емульсією "масло-в-воді".
27. Спосіб за п. 26, за яким крем має рН від приблизно 2,8 до приблизно 3,9.
28. Спосіб за п. 1, за яким вітиліго є сегментарним вітиліго.