


1. Спосіб контролю або попередження зараження рослин кукурудзи фітопатогенними мікроорганізмами роду *Fusarium*, за яким до сільськогосподарської культури рослин кукурудзи, місця їх зростання або матеріалу для їх розмноження застосовують композицію, яка містить сполуку відповідно до формули:



де R11, R12 та A визначені в наступній таблиці:

Сполука	A	R11	R12
1	2-трифторметилпірид-3-ил	Cl	Cl

2. Спосіб за п. 1, за яким композиція додатково містить енантіомер сполуки формули (Ic) у *цис*-конфігурації, де співвідношення сполуки (Ic) і зазначеного енантіомера становить більше ніж 1:1.
3. Спосіб за п. 1 або 2, за яким фітопатогенний мікроорганізм являє собою *Fusarium pseudograminearum*, *Fusarium graminearum* та/або *Fusarium culmorum*.
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, за яким фітопатогенний мікроорганізм являє собою *Fusarium graminearum*.
5. Застосування сполуки, вказаної в п. 1 або 2, для контролю або попередження зараження рослин кукурудзи фітопатогенними мікроорганізмами роду *Fusarium*.
6. Застосування сполуки за п. 5, за яким фітопатогенний мікроорганізм роду *Fusarium* вибирають із *Fusarium pseudograminearum*, *Fusarium graminearum* та/або *Fusarium culmorum*.
7. Застосування сполуки за п. 5 або 6, за яким фітопатогенний мікроорганізм роду *Fusarium* являє собою *Fusarium graminearum*.
8. Спосіб вирощування рослин кукурудзи, за яким щодо рослин кукурудзи або матеріалу для її розмноження застосовують композицію, яка містить сполуку, вказану в п. 1 або 2, або їх обробляють нею.