

1. Склад для місцевого застосування, який містить 1,5 % (мас./мас.) в перерахунку на вільну основу руксолітинібу фосфату, для застосування в способі лікування atopічного дерматиту середнього ступеня тяжкості у пацієнта-людини, при цьому застосування включає нанесення складу на шкіру вказаного пацієнта-людини два рази на день, при цьому пацієнт:

має індекс площі і тяжкості екземи ≥ 16 на початковому рівні;

має площу поверхні тіла з ураженням atopічним дерматитом від 10 до 20 % на початковому рівні;

має бал 3 за загальною оцінкою дослідника на початковому рівні; і

має початковий бал за цифровою рейтинговою шкалою, який дорівнює або перевищує 4.

2. Склад для місцевого застосування за п. 1, який **відрізняється** тим, що пацієнт:

є підлітком у віці від ≥ 12 до 17 років включно або чоловіком чи жінкою у віці ≥ 18 років; і

має діагностований atopічний дерматит щонайменше 2 роки.

3. Склад для місцевого застосування за будь-яким з пп. 1-2, який **відрізняється** тим, що склад для місцевого застосування являє собою склад крему.

4. Склад крему, який містить 1,5 % (мас./мас.) в перерахунку на вільну основу руксолітинібу або його фармацевтично прийнятної солі, для застосування в способі зменшення свербіжу у пацієнта з atopічним дерматитом, де застосування включає нанесення на шкіру вказаного пацієнта-людини, який потребує цього, складу крему два рази на день;

при цьому пацієнт:

має індекс площі і тяжкості екземи ≥ 16 на початковому рівні;

має площу поверхні тіла з ураженням atopічним дерматитом від 10 до 20 % на початковому рівні;

має бал 3 за загальною оцінкою дослідника на початковому рівні; і

має початковий бал за цифровою рейтинговою шкалою, який дорівнює або перевищує 4.

5. Склад крему, який містить 0,75 % (мас./мас.) в перерахунку на вільну основу руксолітинібу або його фармацевтично прийнятної солі, для застосування в способі лікування atopічного дерматиту у пацієнта-людини, де застосування включає нанесення на шкіру вказаного пацієнта-людини, який потребує цього, складу крему два рази на день,

при цьому пацієнт:

має індекс площі і тяжкості екземи ≥ 16 на початковому рівні;

має площу поверхні тіла з ураженням atopічним дерматитом від 10 до 20 % на початковому рівні;

має бал 3 за загальною оцінкою дослідника на початковому рівні; і

має початковий бал за цифровою рейтинговою шкалою, який дорівнює або перевищує 4.

6. Склад крему для застосування за п. 4, який **відрізняється** тим, що нанесення продовжують щонайменше 8 тижнів.
7. Склад крему для застосування за п. 4 або 6, який **відрізняється** тим, що пацієнт має вік 12 років і більше.
8. Склад крему для застосування за п. 5, який **відрізняється** тим, що нанесення продовжують щонайменше 8 тижнів.
9. Склад крему для застосування за п. 5 або 8, який **відрізняється** тим, що пацієнт має вік 12 років і більше.
10. Склад для місцевого застосування для лікування atopічного дерматиту середнього ступеня тяжкості у пацієнта-людини, де вказаний склад для місцевого застосування містить 0,75 % (мас./мас.) в перерахунку на вільну основу руксолітинібу або його фармацевтично прийнятної солі, і вказаний склад для місцевого застосування призначений для нанесення на шкіру пацієнта-людини два рази на день, де вказаний пацієнт-людина:
 - має індекс площі і тяжкості екземи ≥ 16 на початковому рівні;
 - має площу поверхні тіла з ураженням atopічним дерматитом від 10 до 20 % на початковому рівні;
 - має бал 3 за загальною оцінкою дослідника на початковому рівні; і
 - має початковий бал за цифровою рейтинговою шкалою, який дорівнює або перевищує 4.
11. Склад для місцевого застосування за п. 10, де нанесення вказаного складу для місцевого застосування проводять протягом щонайменше 8 тижнів.
12. Склад для місцевого застосування за п. 10 або 11, де пацієнт має вік 12 років або старше.
13. Склад для місцевого застосування за будь-яким з пп. 10-12, який **відрізняється** тим, що у пацієнта-людини діагностований atopічний дерматит, що визначено критеріями Hanifin і Rajika.
14. Склад для місцевого застосування за будь-яким з пп. 10-13, який **відрізняється** тим, що пацієнт-людина має діагноз atopічний дерматит щонайменше 2 роки.
15. Склад для місцевого застосування за будь-яким з пп. 10-14, який **відрізняється** тим, що руксолітиніб або його фармацевтично прийнятна сіль являє собою фосфат руксолітинібу.