


1. Пептидний інгібітор рецептора інтерлейкіну-23, де пептид являє собою: Ac-[Pen]-N-T-[W(7-Me)]-[Lys(Ac)]-[Pen]-Phe[4-(2-аміноетокси)]-[2-Nal]-[THP]-E-N-[3Pal]-[Sarc]-NH₂ (SEQ ID NO:104);

де Pen являє собою L-пеніциламін, Lys(Ac) являє собою N-ε-ацетил-L-лізин, Phe[4-(2-аміноетокси)] являє собою 4-(2-аміноетокси)-L-фенілаланін, 2-Nal являє собою L-2-нафтилаланін, THP являє собою 4-аміно-4-карбокситетрагідропіран, 3Pal являє собою L-3-піридилаланін, і Sarc являє собою саркозин; та

де пептид циклізується за допомогою дисульфідного зв'язку Pen-Pen;


або його фармацевтично прийнятну сіль.

2. Пептидний інгібітор за п. 1, де пептид являє собою:




або його фармацевтично прийнятну сіль.

3. Пептидний інгібітор за п. 2, де пептид являє собою:



5. Фармацевтична композиція, яка містить пептид або його фармацевтично прийнятну сіль за п. 1, і фармацевтично прийнятний носій, наповнювач або розчинник.
6. Фармацевтична композиція за п. 5, де пептид являє собою:



7. Фармацевтична композиція за п. 5, де пептид являє собою:

