

1. Спосіб лікування псоріатичного артрит у пацієнта, який цього потребує, що включає підшкірне введення першої дози антитіла до IL-23p19 на тижні 0 і наступної дози антитіла до IL-23p19 кожні 12 тижнів після цього, причому зазначене антитіло до IL-23p19 вводять пацієнту протягом щонайменше від 24 до 52 тижнів; при цьому перша доза становить 100 або 200 мг і наступна доза становить 100 або 200 мг; і де зазначене антитіло до IL-23p19 містить:

(i) поліпептид легкого ланцюга, який містить амінокислотну послідовність, представлену в SEQ ID NO: 1, і

(ii) поліпептид важкого ланцюга, який містить амінокислотну послідовність, представлену в SEQ ID NO: 2.

2. Спосіб за п. 1, за яким перша доза та наступна доза є однаковими або різними.

3. Спосіб за п. 2, за яким перша доза та наступна доза становлять 100 мг.

4. Спосіб за п. 2, за яким перша доза та наступна доза становлять 200 мг.

5. Спосіб за п. 2, за яким перша доза становить 100 мг і наступна доза становить 200 мг.

6. Спосіб за п. 2, за яким перша доза становить 200 мг і наступна доза становить 100 мг.

7. Спосіб за п. 1, за яким під час лікування у пацієнта не виникає небажаних явищ стосовно серця.