

1. Комбінація атомоксетину або його фармацевтично прийнятної солі та спіронолактону або його фармацевтично прийнятної солі для застосування у лікуванні стану, асоційованого зі спаданням глоткових дихальних шляхів.
2. Комбінація для застосування за п. 1, в якій спіронолактон або його фармацевтично прийнятна сіль являє собою спіронолактон.
3. Комбінація для застосування за п. 1 або 2 для застосування в поєднанні з антагоністом мускаринових рецепторів (MRA).
4. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-3 для застосування в поєднанні з діуретиком.
5. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-4, де атомоксетин або його фармацевтично прийнятну сіль вводять у дозі від 20 до 200 мг.
6. Комбінація для застосування за п. 5, де атомоксетин або його фармацевтично прийнятну сіль вводять у дозі від 25 до 100 мг.
7. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-6, де спіронолактон або його фармацевтично прийнятну сіль вводять у дозі від 10 до 100 мг.
8. Комбінація для застосування за п. 7, де спіронолактон або його фармацевтично прийнятну сіль вводять у дозі від 20 до 80 мг.
9. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-8, де стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою апное сну.
10. Комбінація для застосування за п. 9, де стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою обструктивне апное сну (OSA).
11. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-8, де стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою хропіння.
12. Комбінація для застосування за п. 11, де стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою звичайне хропіння.
13. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-12, де застосування призначене для лікування стану, асоційованого зі спаданням глоткових дихальних шляхів у суб'єкта, який перебуває у стані неясної свідомості, такому як сон.
14. Комбінація для застосування за будь-яким з пп. 1-13, де застосування призначене для лікування стану, асоційованого зі спаданням глоткових дихальних шляхів у суб'єкта, який має гіпертензію.
15. Фармацевтична композиція, яка містить комбінації: (i) атомоксетину або його фармацевтично прийнятної солі та (ii) спіронолактону або його фармацевтично прийнятної солі; та (iii) фармацевтично прийнятний носій.

16. Фармацевтична композиція за п. 15, в якій спіронолактон або його фармацевтично прийнятна сіль являє собою спіронолактон.
17. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 15 або 16, яка додатково містить антагоніст мускаринових рецепторів (MRA).
18. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 15-17, що додатково містить додатковий активний засіб, який являє собою діуретик.
19. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 15-18, в якій атомоксетин або його фармацевтично прийнятна сіль присутні у кількості від 20 до 200 мг.
20. Фармацевтична композиція за п. 19, в якій атомоксетин або його фармацевтично прийнятна сіль присутні у кількості від 25 до 100 мг.
21. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 15-20, в якій спіронолактон або його фармацевтично прийнятна сіль присутні у кількості від 10 до 100 мг.
22. Фармацевтична композиція за п. 21, в якій спіронолактон або його фармацевтично прийнятна сіль присутні у кількості від 20 до 80 мг.
23. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 15-22, в якій композиція являє собою сироп, пігулку, таблетку, пастилку або капсулу.
24. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 15-23 для застосування у лікуванні стану, асоційованого зі спаданням глоткових дихальних шляхів.
25. Фармацевтична композиція для застосування за п. 24, при цьому стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою апное сну.
26. Фармацевтична композиція для застосування за п. 25, при цьому стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою обструктивне апное сну (OSA).
27. Фармацевтична композиція для застосування за п. 24, при цьому стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою хропіння.
28. Фармацевтична композиція для застосування за п. 27, при цьому стан, асоційований зі спаданням глоткових дихальних шляхів, являє собою звичайне хропіння.
29. Фармацевтична композиція для застосування за будь-яким із пп. 24-28, при цьому суб'єкт перебуває у стані неясної свідомості, такому як сон.
30. Фармацевтична композиція для застосування за будь-яким із пп. 24-29, при цьому застосування у лікуванні стану, асоційованого зі спаданням глоткових дихальних шляхів, призначене для суб'єкта, який має гіпертензію.
31. Набір для застосування у лікуванні стану, асоційованого зі спаданням глоткових дихальних шляхів, який містить: (i) атомоксетин або його фармацевтично прийнятну сіль та (ii) спіронолактон або його фармацевтично прийнятну сіль.